



для ветеринарного применения
лекарственного препарата

Алтивазол™ 50

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Алтивазол™ 50 (Altivasol 50).

Международное непатентованное наименование: тилвалозин.

2. Лекарственная форма: порошок для перорального применения.

Алтивазол™ 50 в 1 г в качестве действующего вещества содержит тилвалозин- 50,0 мг (в форме тилвалозина тартрата), а в качестве вспомогательных веществ—муку пшеничную, гидроксипропилцеллюлозу, сою порошковую и магния трисиликат.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой микрогранулированный порошок светло-желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата в закрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения -3 года от даты производства.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Алтивазол™ 50 выпускают расфасованным по 10, 20 и 25 кг в полимерные тканые пакеты с полиэтиленовым вкладышем и по 500 г, 1 и 5 кг в пакеты из ламинированной алюминиевой фольги. Каждую единицу фасовки снабжают инструкцией по применению.

5. Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов в защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от 0°C до 25°C.

6. Алтивазол™ 50 следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Алтивазол™ 50 относится к фармакотерапевтической группе макролидов.

10. Тилвалозина тартрат, входящий в состав лекарственного препарата, активен в отношении грамположительных микроорганизмов, включая *Clostridium perfringens*, *Brachyspira hyodysenteriae*, *Brachyspira pilosicoli*, а также некоторых грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Lawsonia intracellularis*, *Ornithobacterium rhinotracheale* и микоплазм (*Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Mycoplasma meleagridis*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Mycoplasma hyosynoviae* и *Mycoplasma hyorhinis*). Механизм бактериостатического действия тилвалозина заключается в том, что он, связываясь с рибосомой 50S, подавляет синтез белка в микробной клетке на рибосомальном уровне.

После перорального введения тилвалозина тартрат быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте и проникает в большинство органов и тканей организма животного, достигая максимальной концентрации в сыворотке крови через 1-3 часа и сохраняясь на терапевтическом уровне в течение 15-18 часов.

Тилвалозин выводится из организма животных преимущественно в неизмененном виде, в основном с фекалиями и частично с мочой. Основным метаболитом является 3-ацетилтилозин, который также обладает значительной микробиологической активностью.

III. Порядок применения

11. Алтивазол™ 50 применяют с лечебной и лечебно-профилактической целью свиньям - при энзоотической пневмонии, пролиферативной энтеропатии, дизентерии, цыплятам-бройлерам и ремонтному молодняку кур - при инфекционных болезнях бактериальной и микоплазменной этиологии, в том числе микоплазмозе и орнитобактериозе и других первичных и вторичных инфекциях, возбудители которых чувствительны к тилвалозину.

12. Противопоказанием к применению препарата Алтивазол™ 50 является индивидуальная повышенная чувствительность животного к макролидным антибиотикам и тяжелые поражения печени и почек. Запрещается применение лекарственного препарата курам-несушкам и ремонтному молодняку кур менее чем за 2 недели до начала яйцекладки из-за накопления тилвалозина в яйцах.

13. При работе с препаратом Алтивазол™ 50 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом руки и лицо. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами. Все работы с препаратом Алтивазол™ 50 необходимо проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные очки, респиратор). При случайном попадании лекарственного препарата в глаза, на кожу или слизистые оболочки его необходимо немедленно смыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с ним. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению лекарственного препарата или этикетку).

14. Алтивазол™ 50 при необходимости может быть использован для лечения свиноматок в период беременности и лактации под контролем ветеринарного врача.

15. Алтивазол™ 50 применяют свиньям, цыплятам-бройлерам и ремонтному молодняку кур перорально с кормом индивидуально или групповым способом в следующих дозах:

- свиньям в суточной дозе 1-1,5 кг лекарственного препарата на 1000 кг корма в течение 7 дней;
- цыплятам-бройлерам и ремонтному молодняку кур в суточной дозе 2-3 кг лекарственного препарата на 1000 кг корма в течение 7 дней.

Перед применением лекарственный препарат следует тщательно перемешать с кормом.

16. Побочных явлений и осложнений при применении препарата Алтивазол™ 50 в соответствии с настоящей инструкцией у свиней, цыплят-бройлеров и ремонтного молодняка кур, как правило, не наблюдается. В случае появления у свиней аллергических реакций использование лекарственного препарата прекращают и назначают животным антигистаминные средства и симптоматическое лечение.

17. При передозировке лекарственного препарата у животных может наблюдаться снижение аппетита, уменьшение потребления воды и потеря массы.

18. Запрещается применение препарата Алтивазол™ 50 одновременно с другими макролидами, хлорамфениколом и линкомицином, а также с β-лактамами препаратами в связи с возможным взаимным снижением противомикробной активности.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата Алтивазол™ 50, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска очередной дозы применение лекарственного препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Убой свиней и птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 3 суток после окончания применения лекарственного препарата. Мясо животных, убитых ранее установленного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.

22. Организация-производитель: по заказу «АЛПОВЕТ ЛТД», Кипр.