



для ветеринарного применения
лекарственного препарата

Домектал® 10

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Домектал® 10 (Domectal 10).

Международное непатентованное наименование: дорамектин.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Домектал® 10 в 1 мл в качестве действующего вещества содержит дорамектин - 10 мг и вспомогательные вещества: этилолеат и кунжутное масло.

3. По внешнему виду препарат представляет собой бесцветную или с оттенком желтого цвета прозрачную жидкость.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 3 года с даты производства, после первого вскрытия флакона при соблюдении условий асептики - 28 суток.

Запрещается использование препарата по окончании срока годности.

4. Домектал® 10 выпускают расфасованным по 100 мл во флаконы из темного стекла, герметично закрытых бромбутиловыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками с пластиковыми крышками. Каждый флакон помещают в картонную пачку и снабжают инструкцией по применению.

5. Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.

6. Домектал® 10 следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Домектал® 10 относится к противопаразитарным лекарственным средствам группы макроциклических лактонов.

10. Дорамектин- (25-циклогексил - 5 - 0 - диметил- 25 - (1-метилпропил) авермектин A_{1a}) обладает широким спектром противопаразитарного действия в отношении нематод, вшей, кровососок, личинок оводов и клещей. Дорамектин, связываясь с рецепторами клеток мышечной и нервной ткани паразитов, увеличивает проницаемость мембран для ионов хлора, что приводит к блокаде электрической активности нервных и мышечных клеток нематод и членистоногих, их параличу и гибели. Учитывая, что у млекопитающих эти рецепторы локализованы только в центральной нервной системе, а дорамектин через

гематоэнцефалический барьер не проникает, препарат в рекомендуемых дозах опасности для млекопитающих, как правило, не представляет.

Фармакокинетические свойства препарата обеспечивают постепенное всасывание дорамектина из места инъекции, длительное поддержание терапевтических концентраций в крови и защиту животных от возбудителей паразитарных заболеваний в течение длительного времени (до 28 дней) после однократного парентерального введения. Дорамектин практически не метаболизируется и выводится из организма в неизменном виде, преимущественно с фекалиями.

Домектал® 10 по степени воздействия на организм относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Домектал® 10 применяют крупному рогатому скоту, овцам и свиньям слечебной и лечебно-профилактической целью при заболеваниях нематодозов желудочно-кишечного тракта, легких, подкожной клетчатки и слезных протоков, оводовых инвазий, саркоптоидозов (чесотки), энтомозов и ассоциативных паразитарных болезней.

Домектал® 10 применяют:

Крупному рогатому скоту при заболеваниях, вызываемых:

- нематодами желудочно-кишечного тракта (половозрелые и личинки): *Ostertagia ostertagi* (включая инкапсулированные личинки), *O. Lyrata*, *Haemonchus contortus*, *H. Placei*, *H. Similis*, *Trichostrongylus axei*, *T. Colubriformis*, *T. Longispicularis*, *Mecistocirrus digitatus*, *Cooperia oncophora* (включая инкапсулированные личинки), *C. Pectinata*, *C. Punctata*, *C. spatulata*, *C. Sumabada* (синоним *mcmasteri*), *Nematodirus helvetianus*, *N. Spathiger*, *Bunostomum phlebotomum*, *Strongyloides papillosus*, *Oesophagostomum radiatum*, *Trichocephalus discolor*, *T. ovis*;
- легочными нематодами (половозрелые и личинки): *Dictyocaulus viviparus*;
- нематодами слезных протоков: *Thelazia spp*;
- подкожными нематодами: *Parafilaria bovicola*;
- личинками подкожных оводов: *Hypoderma bovis*, *H. Lineatum*, *Dermatobia hominis*;
- вшами: *Haematopinus eurysternus*, *Linognathus vituli*, *Solenopotes capillatus*;
- чесоточными клещами: *Psoroptes bovis*, *Chorioptes bovis*;
- иксодовыми *Boophilus microplus* и аргасовыми *Ornithodoros spp.* клещами.

Овцам при заболеваниях, вызываемых:

- нематодами желудочно-кишечного тракта (половозрелые и личинки): *Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta*, *Haemonchus contortus*, *Trichostrongylus axei*, *T. Colubriformis*, *T. Vitrinus*, *Cooperia curticei* (личинки), *C. Oncophora*, *Oesophagostomum venulosum* (половозрелые), *Nematodirus spp.*, *Strongyloides papillosus*;
- легочными гельминтами: *Dictyocaulus filaria*;
- чесоточными клещами: *Psoroptes ovis*;
- личинками носоглоточного овода: *Oestrus ovis*.

Свиньям при заболеваниях, вызываемых:

- нематодами желудочно-кишечного тракта (взрослые и личинки): *Hyoststrongylus rubidus*, *Ascaris suum*, *Strongyloides ransomi* (половозрелые), *Oesophagostomum quadrispinulatum*, *Trichocephalus suis*;
- легочными нематодами (половозрелые): *Metastrongylus spp*;
- почечными нематодами (половозрелые): *Stephanurus dentatus*;

- вшами: *Haematopinus suis*;
- чесоточными клещами: *Sarcoptes scabiei*.

12. Противопоказанием для применения препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к его компонентам (в том числе в анамнезе). Не следует применять препарат больным инфекционными болезнями, ослабленным и истощенным животным.

13. При работе с препаратом Домектал® 10 необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустые флаконы из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Домектал® 10. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Запрещается применение лекарственного препарата Домектал® 10 беременным коровам менее чем за 60 суток, беременным овцам менее чем за 70 суток до предполагаемых родов (в связи с выделением дорамектина с молоком), новорожденным телятам и ягнятам.

15. Домектал® 10 вводят животным парентерально однократно в следующих дозах:

- крупному рогатому скоту подкожно в область шеи в дозе 1 мл на 50 кг массы животного, что соответствует 0,2 мг/кг массы дорамектина;

- овцам внутримышечно в область шеи или заднебедренной группы мышц в дозе 1 мл на 50 кг массы животного, что соответствует 0,2 мг дорамектина/кг массы животного;

в тяжелых случаях чесотки, особенно при хроническом течении заболевания, дозу препарата увеличивают до 1,5 мл на 50 кг массы животного (0,3 мг дорамектина/кг массы животного);

- свиньям только внутримышечно у основания уха в дозе 1 мл на 33 кг массы животного, что соответствует 0,3 мг дорамектина/кг массы животного.

При низкой температуре окружающей среды (ниже 5 °С) вязкость препарата может повышаться, что затрудняет его введение; в этом случае рекомендуется подогреть препарат до 20-25 °С.

16. Побочных явлений и осложнений при применении препарата Домектал® 10 в соответствии с настоящей инструкцией у животных, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. При передозировке у животных могут наблюдаться следующие симптомы: слабость, тремор, усиленная саливация. Специфические антитоксические средства отсутствуют. В случае передозировки применяют общие меры, направленные на выведение препарата из организма.

18. Домектал® 10 не следует применять одновременно с другими противопаразитарными лекарственными средствами.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлены.

20. Домектал® 10 применяют животным однократно.

21. Убой крупного рогатого скота и овец на мясо разрешается не ранее, чем через 70 суток, свиней — через 77 суток после последнего применения препарата Домектал® 10. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей. Молоко разрешается использовать в пищевых целях не ранее, чем через 60 суток после введения препарата Домектал® 10 стельным коровам и не ранее, чем через 70 суток после введения суягным овцам. Молоко, полученное ранее установленных сроков, может быть использовано после кипячения в корм животным.

22. Организация-разработчик: ALPOVET LTD, Кипр.

Произведено: по заказу ALPOVET LTD, Кипр.

