



по применению
лекарственного препарата
Флорфарм

I. Общие сведения

1. Торговое наименование: Флорфарм для инъекций (Florpharmum pro injectionibus).
Международное непатентованное наименование активной фармацевтической субстанции: флорфеникол, флуниксина меглумин.
Лекарственная форма: раствор для инъекций.
2. Флорфарм для инъекций представляет собой прозрачную маслянистую жидкость от светло-желтой до желтого цвета.
В 1 мл препарата содержится 300 мг флорфеникола и 27 мг флуниксина меглума, вспомогательные и формообразующие вещества (N-метил-2-пирролидон, 1,2-пропиленгликоль, вода для инъекций).
3. Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 100 мл.
4. Флорфарм для инъекций хранят по списку Б в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от + 2°C до + 25°C.
Срок годности - 2 (два) года от даты изготовления при соблюдении условий хранения.
После вскрытия флакона препарат необходимо использовать в течение 14 дней; хранить при температуре от + 2°C до + 8°C. Хранить в местах недоступных для детей.
5. Препарат применяют по назначению ветеринарного врача. Не применять по истечении срока годности.

II. Фармакологические свойства

6. Флорфеникол - бактериостатический антибиотик широкого спектра действия.
Механизм противомикробного действия связан с блокированием синтеза белка на уровне рибосом (связывается с SOS рибосомной субъединицей в протоплазме бактериальной клетки, где блокирует действие фермента пептидилтрансферазы, что приводит к подавлению синтеза протеинов чувствительных бактерий).
Флорфеникол активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus spp.*, *Proteus spp.*, *Enterobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Bordetella spp.*, а также *Mycoplasma spp.*
7. Флуниксин меглумин оказывает анальгезирующее, противовоспалительное, жаропонижающее и антитоксическое действие. Флуниксин является неселективным ингибитором циклооксигеназ (ЦОГ1 и ЦОГ2), угнетает синтез простагландинов E2 - медиаторов воспаления, чем и обусловлен вызываемый им эффект.
8. Препарат быстро всасывается из места введения, проникает во все внутренние органы и ткани. Действие флорфеникола проявляется спустя 5-6 часов, флуниксина через 20-30 минут. Флуниксин кумулируется в очаге воспаления, обеспечивая терапевтический эффект продолжительностью до 24 часов. Терапевтическая концентрация флорфеникола удерживается в организме до 48 часов.
Выделяются компоненты препарата с фекалиями и мочой.

III. Порядок применения

9. Флорфарм для инъекций применяют свиньям и молодняку крупного рогатого скота при колибактериозе, сальмонеллезе, стафилококкозе, стрептококкозе, респираторных, желудочно-кишечных и других заболеваниях, вызванных микроорганизмами чувствительными к флорфениколу.
10. Флорфарм для инъекций вводят подкожно в область шеи в дозах:
 - **телятам:** 2 мл на 15 кг массы однократно или 1 мл на 15 кг массы тела животных двукратно с интервалом 48 часов;
 - **свиньям:** 1 мл на 20 кг массы животного однократно.При необходимости введение препарата повторяют через 48 часов. В одно место рекомендуется вводить не более 10 мл препарата.
11. **Запрещается** применение препарата при тяжелых поражениях системы кроветворения, сердца, печени и почек, при индивидуальной повышенной чувствительности к флорфениколу и флуниксину, с другими нестероидными противовоспалительными средствами, кортикостероидными препаратами, средствами содержащими тиамфеникол и амфениколы. Не допускается одновременное применение с другими антибиотиками, непрямыми антикоагулянтами, барбитуратами, миорелаксантами. Запрещается смешивать препарат в одном шприце с другими лекарственными средствами.
Запрещается применение флорфарма для инъекций **стельным животным, лактирующим коровам, быкам-производителям.**
12. При применении препарата возможны аллергические реакции. На месте введения возможно образование припухлости, исчезающей самостоятельно в течение 3-5 дней.
При наличии аллергической реакции применение препарата прекращают, назначают антигистаминные препараты и препараты кальция.
13. Убой животных на мясо разрешается через 32 суток после последнего введения препарата. В случае вынужденного убоя ранее этого срока, мясо может быть использовано на корм плотоядным животным.

IV. Меры личной профилактики.

14. При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые правила личной гигиены и техники безопасности.
15. В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.
Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией.
При подтверждении неэффективности или несоответствии препарата по внешнему виду, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная, 19а) для подтверждения соответствия препарата нормативной документации.
16. Произведено: по заказу ALPOVET LTD, Кипр.