ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению
лекарственного препарата

Сульфарал® 200/40

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения Сульфарал™ 200/40 (Sulfaral 200/40).

Международное непатентованное наименование: сульфамонометоксин натрия, триметоприм.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Сульфарал™ 200/40 содержит в 100 мл действующих веществ сульфамонометоксин натрия - 20 г и триметоприм - 4 г; в качестве вспомогательных веществ: натрия сульфит, пропиленгликоль, ЭДТА-2Na, бензиловый спирт и воду для инъекций.

3. По внешнему виду Сульфарал™ 200/40 представляет собой бесцветную или желтоватую прозрачную жидкость. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 3 года со дня производства. После первого вскрытия упаковки пригоден к использованию в течение 28 суток при соблюдении условий хранения и правил асептики в пределах основного срока годности. Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Сульфарал™ 200/40 выпускают расфасованным по 50 и 100 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные пробками из бутилкаучука, укупоренными алюминиевыми колпачками и снабженные пластиковыми колпачками контроля первого вскрытия. Каждый флакон упаковывают в индивидуальную картонную коробку и снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 5°С до 30°С.

6. Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: отпускается по рецепту на лекарственный препарат или требованию ветеринарной организации.

II. Фармакологические свойства

9. Сульфарал™ 200/40 относится к группе комбинированных антибактериальных препаратов.

10. Сульфарал™ 200/40 обладает широким антибактериальным спектром действия в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе Escherichia coli, Salmonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp. и других микроорганизмов, а также некоторых простейших, таких как Eimeria spp. и Toxoplasma gondii.

Сульфамонометоксин, сходный по строению с парааминобензойной кислотой, нарушает синтез дигидрофолиевой кислоты в бактериальных клетках, препятствуя включению парааминобензойной кислоты в ее молекулу.

Триметоприм усиливает действие сульфамонометоксина, нарушая восстановление дигидрофолиевой кислоты в тетрагидрофолиевую – активную форму фолиевой кислоты, ответственную за белковый обмен и деление микробной клетки. При комбинированном действии нарушается синтез фолиевой кислоты на двух последовательных стадиях, что приводит к нарушению синтеза нуклеотидов и обусловливает синергидное бактерицидное действие комбинации сульфамонометоксина и триметоприма.

Сульфамонометоксин и триметоприм при парентеральном применении быстро всасываются в кровь и проникают во все органы и ткани организма, где создают антибактериальные концентрации на протяжении 24 часов. Выделяются из организма преимущественно с мочой и желчью.

Сульфарал™ 200/40 по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не вызывает у животных побочных явлений и осложнений.

III. Порядок применения

11. Препарат применяют с лечебной целью крупному рогатому скоту, лошадям, овцам, свиньям и собакам при инфекциях дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочевыводящих путей, вызванных возбудителями, чувствительными к компонентам лекарственного препарата.

12. Запрещается применение Сульфарал™ 200/40 животным с серьезными нарушениями функции почек и / или печени или органов кроветворения, а также с повышенной чувствительностью к триметоприму и / или сульфаниламидам.

13. При работе с препаратом необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом руки.

Людям с гиперчувствительностью к триметоприму или сульфаниламидам следует избегать прямого контакта с препаратом.

Пустая упаковка из-под препарата подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо тотчас смыть проточной водой с мылом. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Лекарственный препарат следует с осторожностью применять животным в период беременности и лактации, а также новорожденным животным.

15. Применяют Сульфарал™ 200/40 внутримышечно 1 раз в день в течение 3-5 дней в дозе 1 мл на 15-20 кг массы животного. При тяжелом течении болезни первую дозу увеличивают до 1 мл на 10 кг массы животного.

Не следует вводить лекарственный препарат в одно место более 10 мл крупному рогатому скоту, свиньям и лошадям, поросятам, овцам и собакам - более 5 мл.

16. Побочных явлений и осложнений, при применении лекарственного препарата в рекомендуемой дозе в соответствии с инструкцией, как правило, не наблюдается. У некоторых животных возможно появление на месте инъекции покраснения и припухлости, которые самопроизвольно проходят и не требуют

применения других лекарственных средств. Собакам пород Ротвейлер и Доберман лекарственный препарат следует применять крайне осторожно ввиду их высокой чувствительности к его компонентам.

17. При передозировке или превышении продолжительности рекомендованного курса лечения возможны нарушения функции почек и желудочно-кишечного тракта. В этом случае необходимо прекратить применение лекарственного препарата и назначить симптоматическое лечение (витаминами и пробиотиками).

18. Запрещается применение Сульфарал™ 200/40 одновременно с препаратами парааминобензойной кислоты (новокаином, прокаином, анестезином, бензокаином) и другими местными анестетиками. Также препарат не должен применяться с витаминами группы В (никотинамид, фолиевая кислота, холин) из-за их антагонистического действия на сульфаниламиды.

19. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы ветеринарного препарата, так как эго может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в предусмотренных дозировках и схеме применения.

21. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 28 суток после последнего применения препарата.

Молоко дойных животных запрещается использовать в пищевых целях в течение 5 суток после последнего применения препарата. Полученное ранее этого срока молоко после термической обработки используют в корм животным.

Организация-разработчик: ALPOVET LTD, Кипр.
Произведено: по заказу ALPOVET LTD, Кипр.